

Vaccin antipneumococcique et maladies rénales

 Les vaccins antipneumococciques protègent contre la *bactérie Streptococcus pneumoniae* qui cause l'*infection pneumococcique invasive*.

SYMPTÔMES DE L'INFECTION PNEUMOCOCCIQUE INVASIVE

- Toux
- Fièvre, tremblements et frissons
- Essoufflement
- Douleur thoracique
- Fatigue
- Nausées
- Vomissements
- Diarrhée

COMPLICATIONS DE L'INFECTION PNEUMOCOCCIQUE INVASIVE

- Pneumonie
- Inflammation du cœur, des poumons et du système nerveux
- Grave infection du sang

RECOMMANDATIONS POSOLOGIQUES ET CALENDRIER DE VACCINATION ANTIPNEUMOCOCCIQUE

LES PERSONNES ATTEINTES D'UNE MALADIE RÉNALE (avant la dialyse)

- 1 dose de **PCV20 ou PCV21*** peu importe une vaccination pneumococcique précédente (au besoin).

LES PERSONNES EN DIALYSE

- 1 dose de **PCV20 ou PCV21*** peu importe une vaccination pneumococcique précédente.
- Des doses additionnelles pourraient être offertes aux au besoin.

LES PERSONNES AYANT REÇU UNE TRANSPLANTATION

- 1 dose de **PCV20 ou PCV21*** peu importe une vaccination pneumococcique précédente.
- Doivent recevoir le vaccin antipneumococcique au moins deux semaines avant l'intervention chirurgicale (si non offert à l'âge adulte ou si l'immunité est faible).

*Une série de **PCV15** suivie du **PPSV23** 8 semaines plus tard pourrait être offerte si le **PCV20** ou **PCV21** ne sont pas disponibles.

QUELS VACCINS ANTIPNEUMOCOCCIQUES LES PERSONNES ATTEINTES D'UNE MALADIE RÉNALE DEVRAIENT-ELLES RECEVOIR?

- Six vaccins non vivants approuvés au Canada (**PCV10**, **PCV13**, **PCV15**, **PCV20**, **PCV21** et **PPSV23**)**.
- Le **PCV20** et le **PCV21** sont privilégiés parce qu'ils protègent contre un plus grand nombre de types de la bactérie pneumocoque.

**La disponibilité et la couverture des vaccins peuvent varier d'une province à l'autre.

Suivez toujours les conseils et les recommandations de votre équipe soignante pour établir les vaccins qui vous conviennent et le moment de les recevoir.

Si vous avez précédemment reçu le vaccin PPSV23 : le vaccin PCV20 ou PCV21 sont recommandés après **1 an**. Une plus courte période pourrait être offerte pour les personnes immunosupprimées ou sur le point de prendre des médicaments immunosuppresseurs.

Si vous avez précédemment reçu le vaccin PCV13 ou PCV15 : le PCV20 ou le PCV21 sont recommandés après au moins 8 semaines.

Consultez votre équipe soignante pour établir le moment et le type de vaccin à recevoir.

SÉCURITÉ DES VACCINS ANTIPNEUMOCOCCIQUES POUR LES PERSONNES ATTEINTES D'UNE MALADIE RÉNALE

- La sécurité des vaccins antipneumococciques précédents a été démontrée pour les personnes ayant des problèmes de santé rénale.
- Le PCV21 étant plus nouveau, moins d'information est disponible sur sa sécurité, surtout pour des groupes particuliers à risque.
- Il n'y a actuellement aucune preuve qui suggère que la vaccination avec le PCV20 ou PCV21 pourrait modifier ou empirer la fonction rénale.

******La disponibilité et la couverture des vaccins peuvent varier d'une province à l'autre.

Suivez toujours les conseils et les recommandations de votre équipe soignante pour établir les vaccins qui vous conviennent et le moment de les recevoir.