

Vaccin contre la COVID-19 et maladies rénales



Les vaccins contre la COVID-19 protègent contre le **virus SARS-CoV-2**.

SYMPTÔMES DE LA COVID-19

- Toux
- Fièvre et frissons
- Difficulté à respirer
- Fatigue/faiblesse
- Douleur abdominale, diarrhée, vomissements
- Écoulement nasal ou éternuements
- Mal de gorge
- Douleurs musculaires, maux de tête, courbatures
- Perte du goût ou de l'odorat

COMPLICATIONS DE LA COVID-19

- Problèmes graves de respiration
- Inflammation des poumons
- Lésions aux poumons
- Atteintes ou lésions rénales
- Autres lésions à des organes (foie, cœur)

RECOMMANDATIONS POSOLOGIQUES ET CALENDRIER DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19

- **Série primaire** (si vaccins non reçus avant): 2 à 3 doses de tout vaccin mis à jour, 4 à 8 semaines d'intervalle.
- **Doses de rappel** (si vaccins reçus précédemment): 1 dose de tout vaccin mis à jour tous les 6 mois (automne et printemps).

LES PERSONNES ATTEINTES D'UNE MALADIE RÉNALE (avant la dialyse)

- Comme indiqué ci-haut.

LES PERSONNES EN DIALYSE

- Pourraient être admissibles à **une dose additionnelle** durant la série primaire.
- Pourraient être admissible à **des doses de rappel additionnelles** (jusqu'à tous les 3 mois).

LES PERSONNES AYANT REÇU UNE TRANSPLANTATION

- Recevoir la série primaire et les doses de rappel requises avant l'intervention chirurgicale ou le début de la prise de médicaments immunosuppresseurs.
- Peuvent recevoir les doses de rappel de nouveau 3 à 6 mois après l'intervention chirurgicale, selon les directives de l'équipe soignante.

La période entre la série primaire et les doses de rappel peut être modifiée si vous avez la COVID-19 ou l'avez eu entre les doses. Consultez votre équipe soignante si cela s'applique à votre situation.

QUELS VACCINS CONTRE LA COVID-19 LES PERSONNES ATTEINTES D'UNE MALADIE RÉNALE DEVRAIENT-ELLES RECEVOIR?

- Les vaccins contre la COVID-19 sont mis à jour chaque année pour protéger contre les souches du virus qui sont les plus courantes ou graves.

*La disponibilité et la couverture des vaccins peuvent varier d'une province à l'autre.

Suivez toujours les conseils et les recommandations de votre équipe soignante pour établir les vaccins qui vous conviennent et le moment de les recevoir.

- Tous les vaccins mis à jour peuvent être utilisés pour la série primaire et les doses de rappel.
- Les vaccins à ARN messenger sont privilégiés parce qu'ils produisent une réponse immunitaire plus forte.

Consultez votre équipe soignante pour établir le vaccin qui vous convient et le moment de le recevoir.



Pour des informations et les recommandations à jour, consultez la [page COVID-19 : Situation actuelle](#) de santé Canada.

SÉCURITÉ DES VACCINS CONTRE LA COVID-19 POUR LES PERSONNES ATTEINTES D'UNE MALADIE RÉNALE

- La recherche et les avis d'experts actuels indiquent que les vaccins contre la COVID-19 sont sécuritaires pour les personnes atteintes d'une maladie rénale.
- Les vaccins contre la COVID-19 n'ont pas démontré de dommages, de changements ou de détérioration de la fonction rénale.

FOIRE AUX QUESTIONS

Dois-je me faire vacciner pour recevoir une transplantation?

La réglementation locale ou provinciale peut exiger que vous receviez un vaccin avant la chirurgie de transplantation. Pour cette raison, nous vous encourageons à en parler avec votre équipe ou centre de transplantation.

La Société canadienne de transplantation recommande de recevoir le vaccin contre la COVID-19 avant et après l'intervention chirurgicale pour quatre principales raisons :

1. La COVID-19 peut causer une maladie grave chez les personnes ayant reçu une transplantation;
2. Les personnes ayant reçu une transplantation sont souvent atteintes de maladies concomitantes;
3. La sécurité du vaccin contre le SARS-CoV-2 a été démontrée;
4. La transplantation n'est pas un facteur de risque d'effets secondaires du vaccin contre la COVID-19.

Est-ce que la formulation du vaccin contre la COVID-19 que je reçois à titre de dose de rappel cet automne importe?

Non! Tous les vaccins conviennent aux personnes atteintes d'une maladie rénale à titre de dose de rappel cet automne. Toutefois, les vaccins à ARN messenger sont recommandés parce qu'ils produisent une réponse immunitaire plus forte.

Quel vaccin contre la COVID-19 devrais-je recevoir?

Les vaccins à ARN messenger sont recommandés parce qu'ils produisent une réponse immunitaire plus forte. Toutefois, il n'y a aucune preuve indiquant qu'un vaccin à ARN messenger est meilleur qu'un autre pour les personnes atteintes d'une maladie rénale.

*La disponibilité et la couverture des vaccins peuvent varier d'une province à l'autre.

Suivez toujours les conseils et les recommandations de votre équipe soignante pour établir les vaccins qui vous conviennent et le moment de les recevoir.